※※2016年 6月改訂 (第16版)

※2015年 9月改訂

貯 法:室温(高温を避けて保存)

使用期限:包装に表示の使用期限内に使用すること

注 意: 【取扱い上の注意】 の項参照

日本標準商品分類番号 872473

· *		エストラーナテープ	エストラーナテープ	エストラーナテープ	エストラーナテープ
× ××		<u>0.09mg</u>	<u>0.18mg</u>	0.36mg	0.72mg
	承認番号	22700AMX00357000	22700AMX00356000	22700AMX00355000	21900AMX01357000
	薬価収載	2015年6月	2015年6月	2015年6月	2007年12月
	販売開始	2015年9月	2015年9月	2015年9月	2000年2月
	効能追加				2014年2月
	国際誕生	1999年10月			
	再審査結果				2009年6月

経皮吸収型 エストラジオール製剤

\*\* エストラーナ。テープ 0.09mg ESTRANA。TAPE 0.09mg

\*\* エストラーナ。テープ 0.18mg ESTRANA。TAPE 0.18mg

\* エストラーナ。テープ 0.36mg ESTRANA。TAPE 0.36mg エストラーナ。テープ 0.72mg ESTRANA。TAPE 0.72mg

処方箋医薬品

- 医師等の処方箋 により使用すること。 エストラジオール貼付剤

# 【禁忌】(次の患者には使用しないこと)

- 1.エストロゲン依存性悪性腫瘍(例えば乳癌、子宮内膜癌)及びその 疑いのある患者[腫瘍の悪化あるいは顕性化を促すことがある。]
- 2.乳癌の既往歴のある患者 1)
- 3.未治療の子宮内膜増殖症のある患者[子宮内膜増殖症は 細胞異型を伴う場合があるため。]
- 4. 血栓性静脈炎や肺塞栓症のある患者、又はその既往歴のある 患者[卵胞ホルモン剤は凝固因子を増加させ、血栓形成傾向を 促進するとの報告がある。]
- 5.動脈性の血栓塞栓疾患(例えば、冠動脈性心疾患、脳卒中) 又はその既往歴のある患者(「9.その他の注意」の項参照)
- 6. 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
- 7. 妊婦又は妊娠している可能性のある女性及び授乳婦(「6. 妊婦、 産婦、授乳婦等への投与」の項参照)
- 8. **重篤な肝障害のある**患者[代謝能が低下しており肝臓への負担が増加するため、症状が増悪することがある。]
- 9.診断の確定していない異常性器出血のある患者[出血が子宮 内膜癌による場合は、癌の悪化あるいは顕性化を促すことがある。]

# \*\*\*【組成·性状】

	販売名	<u>エストラーナ</u> テープ0.09mg	エストラーナ テープ0.18mg	<u>エストラーナ</u> テープ0.36mg	エストラーナ テープ0.72mg
	有効成分	エストラジオール			
	<u>有効成分</u> 含量 (1枚中)	エストラジオール 0.09mgを 含有する。	エストラジオール 0.18mgを 含有する。	エストラジオール 0.36mgを 含有する。	エストラジオール 0.72mgを 含有する。
添加物 クロタミトン、ジブチルヒドロキシトルエン、水素添加ロジェステル、スチレン・イソブレン・スチレンブロック共重合イブチレン、流動パラフィン、その他1成分を含有する。 無色の音体をうすいだいだい色の支持体に展延した楕一ブ剤である。				重合体、ポリイソ	
				た楕円形のテ	
	外形 断面図 育体 ライナー			支持体 //	
	大きさ	<u>長径:13.0mm、</u> <u>短径:11.0mmの</u> <u>楕円形</u>	長径:18.5mm、 短径:15.5mmの 楕円形	<u>長径:26.1mm、</u> <u>短径:22.0mmの</u> <u>楕円形</u>	長径:37 <u>.0m</u> m、 短径:31 <u>.0m</u> mの 楕円形
	<u>面積</u>	1.125cm <sup>2</sup>	2.25cm <sup>2</sup>	4.5cm <sup>2</sup>	9cm²
	識別 コード	<u>HP374T</u>	<u>HP373T</u>	<u>HP372T</u>	НР371Т

# 【効能・効果】及び【用法・用量】

効能·効果	用法·用量
更年期障害及び卵巣欠落 症状に伴う下記症状 血管運動神経症状(Hot flush及び発汗)、泌尿生 殖器の萎縮症状	通常、成人に対しエストラジオールとして 0.72mgを下腹部、臀部のいずれかに貼付 し、2日毎に貼り替える。
閉経後骨粗鬆症	
性腺機能低下症、性腺摘 出又は原発性卵巣不全に よる低エストロゲン症	通常、成人に対しエストラジオールとして 0.72mgから開始する。下腹部、臀部のいずれかに貼付し、2日毎に貼り替え、症状に応じ増減する。 小児では、エストラジオールとして 0.09mgから開始する。下腹部、臀部のいずれかに貼付し、2日毎に貼り替える。その後、エストラジオールとして0.18mg、エストラジオールとして0.72mgへ段階的に増量 する。

#### 〈用法・用量に関連する使用上の注意〉

- (1) 「閉経後骨粗鬆症」に本剤を使用する場合、使用後6カ月~1 年後に骨密度を測定し、効果が認められない場合には使用 を中止し、他の療法を考慮すること。
- (2) 成人の「性腺機能低下症、性腺摘出又は原発性卵巣不全による 低エストロゲン症」の治療を目的に本剤を使用する場合は、定 期的に中止又は漸減の判断を行い、最少量で治療を行うこと。
- (3) 小児の「性腺機能低下症、性腺摘出又は原発性卵巣不全による低エストロゲン症」の治療を目的に本剤を使用する場合は、使用後6カ月~1年を目処に増量を検討すること。また、定期的に症状や血中エストラジオール濃度等を確認し、増量や中止又は漸減の判断を行うこと。

### 【使用上の注意】

- 1. 慎重投与(次の患者には慎重に使用すること)
  - (1)子宮筋腫のある患者[子宮筋腫の発育を促進するおそれがある。]
  - (2) 子宮内膜症のある患者[症状が増悪するおそれがある。]
  - (3) 乳癌家族素因が強い患者、乳房結節のある患者、乳腺症の 患者又は乳房レントゲン像に異常がみられた患者[症状を悪化 させるおそれがある。]
  - (4) 高血圧、心疾患、腎疾患のある患者、又はその既往歴のある 患者[卵胞ホルモン剤の過量投与では体液貯留をきたし、これ らの疾患を悪化させるおそれがある。]
  - (5) 糖尿病患者[耐糖能を低下させるおそれがあるので十分管理を行いながら使用すること。]

- (6) 片頭痛、てんかんのある患者[症状を悪化させることがあるので、 観察を十分に行うこと。]
- (7) 肝障害のある患者[肝障害を悪化させるおそれがあるので、 定期的に肝機能検査を実施するなど観察を十分に行うこと。]
- (8) 術前又は長期臥床状態の患者[血液凝固能が亢進され、 心血管系の副作用の危険性が高くなることがある。]
- (9) 全身性エリテマトーデスの患者[症状を悪化させるおそれがある。]

### 2. 重要な基本的注意

- (1) 外国において、卵胞ホルモン剤と黄体ホルモン剤を長期併用した女性では、乳癌になる危険性が対照群の女性と比較して高くなり、その危険性は併用期間が長期になるに従って高くなるとの報告があるので、本剤の使用にあたっては、患者に対し本剤のリスクとベネフィットについて十分な説明を行うとともに必要最小限の使用にとどめ、漫然と長期使用を行わないこと。(「9.その他の注意」の項参照)
- (2) 使用前に病歴、家族素因等の問診、乳房検診並びに婦人科検診(子宮を有する患者においては子宮内膜細胞診及び超音波検査による子宮内膜厚の測定を含む)を行い、使用開始後は定期的に血圧、乳房検診並びに婦人科検診を行うこと。(「1.慎重投与」の項(1)~(4)参照)

# 3. 相互作用

本剤は主に薬物代謝酵素チトクロームP450(CYP3A4)で代謝されるので、本酵素の活性に影響を及ぼす薬剤と併用する場合には、注意して使用すること。

### 併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子		
リファンビシン 抗てんかん剤 フェノバルビタール フェニトイン カルバマゼピン HIV逆転写酵素阻害剤 エファビレンツ セイヨウオトギリンウ(StJohn's Wort、セント・ジョーンズ・ ワート)含有食品 ステロイドホルモン	本剤の代謝が促進され、 血中濃度が低下する おそれがある。	これらの薬剤等は薬物代謝酵素チトクロームP450(CYP3A4)を誘導することにより、本剤の代謝を促進し、血中濃度を低下させる可能性がある。		
プロテアーゼ阻害剤 リトナビル ネルフィナビル等	本剤の血中濃度が変 化するおそれがある。	これらの薬剤は薬物代 謝酵素チトクロームP450 (CYP3A4)を誘導又は 阻害する可能性がある。		

### 4. 副作用

# \*\*\* ○更年期障害及び卵巣欠落症状

更年期障害及び卵巣欠落症状に対するエストラーナテープ0.72mgの国内臨床試験において、副作用調査対象例数386例中、臨床症状として186例(48.2%)に369件の副作用が認められた。主な副作用の発現頻度は全身性症状として131例(33.9%)207件で、乳房緊満感62件(16.1%)、帯下40件(10.4%)、子宮出血34件(8.8%)等であった。また、局所性の皮膚症状(貼付部位)としては111例(28.8%)162件で、その症状は紅斑、瘙痒等であった。また、エストラーナテープ0.72mgの貼付によると思われる主な臨床検査値異常は、トリグリセライド上昇2.9%(10件/345例)、総コレステロール上昇1.7%(6件/348例)、LDH上昇1.1%(4件/349例)等であった。(エストラーナテープ0.72mg承認時)

#### ※※○閉経後骨粗鬆症

エストラーナテープ0.72mgの国内臨床試験において、副作用調査対象例数461例中、臨床症状として248例(53.8%)に481件の副作用が認められた。主な副作用の発現頻度は全身性症状として183例(39.7%)348件で、子宮出血54件(11.7%)、乳房緊満感49件(10.6%)、乳房痛26件(5.6%)等であった。また、局所性の皮膚症状(貼付部位)としては105例(22.8%)133件で、その症状は紅斑、瘙痒等であった。また、エストラーナテープ0.72mgの貼付によると思われる主な臨床検査値異常は、トリグリセライド上昇4.3%(18件/421例)、ALT(GPT)上昇2.8%(12件/425例)、フィブリノーゲン増加2.5%(10件/403例)、AST(GOT)上昇2.1%(9件/419例)等であった。(エストラーナテープ0.72mg承認時)

\*\*\* エストラーナテープ0.72mgの製造販売後調査の総症例558例中、 副作用が報告されたのは99例(17.7%)108件であった。その主な症 状は不正子宮出血69件(12.4%)、乳房痛5件(0.9%)、乳房不快感5 件(0.9%)、接触性皮膚炎4件(0.7%)等であった。(エストラーナテー プ0.72mg再審査終了時)

#### (1) 重大な副作用(頻度不明)注1)

### 1) アナフィラキシー

アナフィラキシーがあらわれることがあるので、観察を十分 に行い、異常が認められた場合には使用を中止し、適切な処 置を行うこと。

# 2) 静脈血栓塞栓症、血栓性静脈炎

このような症状があらわれることがあるので、観察を十分に行い、下肢の疼痛・浮腫、胸痛、突然の息切れ、急性視力障害等の初期症状が認められた場合には使用を中止し、適切な処置を行うこと。また、患者に対しては、異常が認められた場合には直ちに医師等に相談するよう、あらかじめ説明すること。

\*\*\* 注1)エストラーナテープ0.72mgの国内の臨床試験及び使用成 績調査では認められず、エストラーナテープ0.72mgの自発 報告あるいは海外において認められている。

#### ※(2) その他の副作用

次のような副作用があらわれた場合には使用を中止する等、 適切な処置を行うこと。

部位別	頻度不明注1)	5%以上	0.1~5%未満	0.1%未満
皮膚 注2)		一次刺激性の 接触皮膚炎 (紅斑、瘙痒等)	かぶれ、水疱、 色素沈着	
生殖器		不正出血、 消退出血	带下、外陰部腫脹感、 外陰部瘙痒感、 子宮内膜増殖	
乳房		乳房緊満感	乳房痛、乳頭痛、 乳腺症	
精神神経系	片頭痛		頭痛、眠気、めまい	不眠
循環器	静脈瘤の 悪化		動悸	胸部不快感、 血圧上昇
消化器			嘔吐、嘔気、下痢、 腹部膨満感、便秘、 心窩部痛	
電解質代謝			浮腫	
過敏症	アレルギー性 接触皮膚炎		全身の瘙痒、発疹、 顔面瘙痒、顔面紅斑	蕁麻疹
肝臓	胆石症、胆嚢 疾患、胆汁うっ 滞性黄疸	_	肝機能障害(AST (GOT)、ALT(GPT)、 Al-P、LDH上昇等)	
その他	下肢痛、ポルフィリン症の 悪化、喘息 の悪化、耳 硬化症		腹痛、下腹部痛、 関節痛、腰痛、耳鳴、 体重の増加、背部痛、 倦怠感、トリグリセラ イド上昇、フィブリノー ゲン増加	体重の減少、 発熱

- \*\*\* 注1) エストラーナテープ0.72mgの国内の臨床試験及び使用成 績調査では認められず、エストラーナテープ0.72mgの 自発 報告あるいは海外において認められている。
  - 注2) このような症状を避けるため、毎回貼付部位を変えることが 望ましい。

同種の薬剤で以下の副作用が報告されている。

- 1)電解質代謝:特に大量継続投与により、ナトリウムや体液の 貯留があらわれることが報告されている。
- 2)長期連用:まれに血栓症が起こることが報告されている。

### 5. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので患者の状態を 観察しながら慎重に使用すること。

### 6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

- (1) 妊婦又は妊娠している可能性のある女性には使用しないこと。「卵胞ホルモン剤であるジエチルスチルベストロールを妊娠動物あるいは妊婦に投与したとき、出生児に生殖器系臓器の異常が報告されている。エストラジオールのヒトにおける催奇形性の報告はないが、妊娠動物への投与によって児の生殖器系臓器に異常が起こることが報告されている。ヒトにおいて、妊娠中の女性ホルモン剤(経口避妊薬等)投与によって児の先天性異常(先天性心臓奇形及び四肢欠損症)のリスク増加の報告がある。」
- (2) 授乳中の女性には使用しないこと。[ヒトにおいて、母乳中への移行が報告されている。また、動物実験(マウス)で新生児に卵胞ホルモン剤を投与した場合、児の成長後膣上皮の癌性変化を認めたとの報告がある。]

(3) 卵胞ホルモン剤を妊娠動物に投与した場合、児の成長後、 膣上皮及び子宮内膜の癌性変化を示唆する結果が報告されている。また新生児に投与した場合、児の成長後膣上皮 の癌性変化を認めたとの報告がある。

#### 7. 小児等への投与

思春期前の小児に対し卵胞ホルモン剤を長期間にわたり、大量に反 復投与した場合は、骨端閉鎖が起こり低身長となるおそれがある。

#### 8. 適用上の注意

#### 貼付部位

- (1) 本剤を背部に貼付した場合、下腹部に比べてエストラジオールの血中濃度が高くなることがある。
- (2) 衣服との摩擦ではがれるおそれがあるため、ベルトライン を避けること。また、胸部に貼付しないこと。
- (3) 創傷面又は湿疹・皮膚炎等がみられる部位は避けて貼付すること。
- (4) 皮膚刺激を避けるため、毎回貼付部位を変えることが望ましい。

### ※ 貼付時

- (1) 貼付部位の皮膚を拭い、清潔にしてから本剤を貼付すること。 また、貼付部位の水分は十分に取り除くこと。
- (2) 本剤をハサミ等で切って使用しないこと。

#### 9. その他の注意

(1) 本剤の投与方法としては、連続投与法あるいは周期的投与法 (3週間連続貼付し、1週間休薬するなど)がある。

#### ※※「参考]

黄体ホルモン剤の併用投与については、以下の方法がある。

- 1)国内臨床試験での投与方法
  - ①下記の投与方法にて、エストラーナテープ0.72mgの更年期障害 及び卵巣欠落症状に対する有効性・安全性が認められている。
    - ○長期投与(6カ月以上)

エストラーナテープ0.72mgを2日毎に貼り替え3週間連続貼付し、1週間休薬。エストラーナテープ0.72mg貼付期間の後半12日間は黄体ホルモン剤を併用。黄体ホルモン剤は原則として酢酸メドロキシプロゲステロン(MPA)5mg/日を投与。



- ②下記の投与方法にて、エストラーナテープ0.72mgの閉経後 骨粗鬆症に対する有効性・安全性が認められている。
  - ○エストラーナテープ0.72mgを2日毎に貼り替え休薬期間 を入れずに連続貼付し、4週間の前半12日間に黄体ホル モン剤を併用。黄体ホルモン剤は原則として酢酸メドロキシ プロゲステロン(MPA)5mg/日を投与。

0	1	2	3	4週間	
	エストラーナテープ0.72mgを2日毎に貼り替え				
	黄体ホルモン剤 12日間				

# 2)その他の投与方法

上記臨床試験で使用された投与方法の他、下記の投与方法 がある。

○卵胞ホルモン剤・黄体ホルモン剤連続投与法卵胞ホルモン剤と黄体ホルモン剤を連続して投与する方法。



(2) ホルモン補充療法 (HRT)と子宮内膜癌の危険性

卵胞ホルモン剤を長期間(約1年以上)使用した閉経期以降の女性では、子宮内膜癌になる危険性が対照群の女性と比較して高く、この危険性は、使用期間に相関して上昇し(1~5年間で2.8倍、10年以上で9.5倍)、黄体ホルモン剤の併用により抑えられる(対照群の女性と比較して0.8倍)との疫学調査の結果が報告されている<sup>2)</sup>。

#### (3) HRTと乳癌の危険性

①米国における閉経後女性を対象とした無作為化臨床試験(Women's Health Initiative(WHI)試験)の結果、結合型エストロゲン・黄体ホルモン配合剤投与群では、乳癌になる危険性がプラセボ投与群と比較して有意に高くなる(ハ

ザード比:1.24)との報告がある<sup>3)</sup>。並行して行われた子宮 摘出者に対する試験の結果、結合型エストロゲン単独投与 群では、乳癌になる危険性がプラセボ投与群と比較して有 意差はない(ハザード比:0.80)との報告がある<sup>4)</sup>。

②英国における疫学調査(Million Women Study(MWS))の結果、卵胞ホルモン剤と黄体ホルモン剤を併用している女性では、乳癌になる危険性が対照群と比較して有意に高くなり(2.00倍)、この危険性は、併用期間が長期になるに従って高くなる(1年未満:1.45倍、1~4年:1.74倍、5~9年:2.17倍、10年以上:2.31倍)との報告がある<sup>5)</sup>。

#### (4) HRTと冠動脈性心疾患の危険性

米国におけるWHI試験の結果、結合型エストロゲン・黄体ホルモン配合剤投与群では、冠動脈性心疾患の危険性がプラセボ投与群と比較して高い傾向にあり、特に服用開始1年後では有意に高くなる(ハザード比:1.81)との報告がある<sup>6)</sup>。並行して行われた子宮摘出者に対する試験の結果、結合型エストロゲン単独投与群では、冠動脈性心疾患の危険性がプラセボ投与群と比較して有意差はない(ハザード比:0.91)との報告がある<sup>7)</sup>。

### (5) HRTと脳卒中の危険性

米国におけるWHI試験の結果、結合型エストロゲン・黄体ホルモン配合剤投与群では、脳卒中(主として脳梗塞)の危険性がプラセボ投与群と比較して有意に高くなる(ハザード比: 1.31)との報告がある<sup>8)</sup>。並行して行われた子宮摘出者に対する試験の結果、結合型エストロゲン単独投与群では、脳卒中(主として脳梗塞)の危険性がプラセボ投与群と比較して有意に高くなる(ハザード比:1.37)との報告がある<sup>9)</sup>。

#### (6) HRTと認知症の危険性

米国における65歳以上の閉経後女性を対象とした無作為 化臨床試験(WHI Memory Study(WHIMS))の結果、結合 型エストロゲン・黄体ホルモン配合剤投与群では、アルツ ハイマーを含む認知症の危険性がプラセボ投与群と比較 して有意に高くなる(ハザード比:2.05)との報告がある<sup>10,11)</sup>。 並行して行われた子宮摘出者に対する試験の結果、結合型 エストロゲン単独投与群では、アルツハイマーを含む認知 症の危険性がプラセボ投与群と比較して有意ではないが、 高い傾向がみられた(ハザード比:1.49)との報告がある<sup>12,13)</sup>。

### (7) HRTと卵巣癌の危険性

- ①卵胞ホルモン剤を長期間使用した閉経期以降の女性では、 卵巣癌になる危険性が対照群の女性に比較して高くなる との疫学調査の結果が報告されている $^{14\sim16)}$ 。
- ②米国におけるWHI試験の結果、結合型エストロゲン・黄体ホルモン配合剤投与群において、卵巣癌になる危険性がプラセボ投与群と比較して有意ではないが、高い傾向がみられた(ハザード比:1.58)との報告がある<sup>17)</sup>。

# (8) HRTと胆嚢疾患の危険性

米国におけるWHI試験の結果、結合型エストロゲン・黄体ホルモン配合剤投与群において、胆嚢疾患になる危険性がプラセボ投与群と比較して有意に高くなる(ハザード比:1.59)との報告がある。並行して行われた子宮摘出者に対する試験の結果、結合型エストロゲン単独投与群では、胆嚢疾患になる危険性がプラセボ投与群と比較して有意に高くなる(ハザード比:1.67)との報告がある<sup>18)</sup>。


- (9) 卵胞ホルモン剤投与と乳癌発生との因果関係については 未だ明らかではないが、使用期間と相関性があることを示 唆する疫学調査の結果が報告されている<sup>19)</sup>。
- (10) 卵胞ホルモン剤の長期投与により、ヒトで肝腫瘍が発生したとの報告がある。
- (11)実験動物に卵胞ホルモン剤を皮下投与(埋め込み投与を含む)したとき、マウスにおけるリンパ系腫瘍、ラットの下垂体腺腫及びハムスターにおいては腎腫瘍の発生が報告されている。

### 【薬物動態】

# \*\*1. 血清中濃度<sup>20)</sup>


閉経後の健康女性にエストラーナテープ0.72mg1枚を48時間単回 貼付したとき、血清中エストラジオール(E2)濃度は貼付後緩やか に上昇し、貼付後8~12時間後から除去時までほぼ一定のE2濃度

(52.0~53.8pg/mL)を維持し、除去後は速やかに減少した。血清 中エストロン(E1)濃度については、貼付前から内因性のE1濃度 が検出され、エストラーナテープ0.72mgの貼付による明らかな濃 度の上昇は認められなかった。また、除去後のE2消失半減期は 約2時間であった。



# 2. 蓄積性21)

閉経後の健康女性にエストラーナテープ0.72mg1枚を7回(14 日間) 反復貼付したとき、血清中E2濃度は第2回貼付以降から 定常状態に達し、各貼付時の貼付48時間後の濃度は平均で52.5 ~60.5pg/mLであった。また、尿中排泄においても第1回目の 排泄量に対する第7回目との比は平均でそれぞれ1.21±0.24(総 E2)、1.34±0.37(総E1)であり、蓄積傾向は認められなかった。



### 【臨床成績】

※※ 1. 更年期障害及び卵巣欠落症状<sup>22~25)</sup>

更年期障害及び卵巣欠落症状を有する患者を対象としたエ ストラーナテープ0.72mgの一般臨床試験及び比較試験にお いて、診断名別の全般改善度(中等度改善以上)は、更年期 障害で86.5%(211/244)、卵巣欠落症状では84.2% (85/101)であり、評価したすべての症状項目(血管運動神経 症状、泌尿生殖器の萎縮症状)に高い改善率が認められた。

2. 閉経後骨粗鬆症26)

DXA法による骨密度の変化率は、閉経後骨粗鬆症146例 で平均4.83±0.389%の増加を示し、骨密度の改善が確認 された。

# 【薬効薬理】

(1)血管運動神経症状に対する作用

- 1) 卵 巣 摘 出 ラットに エストラジオール (E<sub>2</sub>) 0.3 又 は 1.0 μg/匹/日を浸透圧ミニポンプにより持続皮下投与 すると、卵巣摘出による尾部皮膚温上昇を有意に 抑制する27)。
- 2) 更年期症状を有する閉経後の女性にエストラジオー ル貼付剤を貼付したとき、hot flushの発現頻度と血 清中E2濃度との間に負の相関が認められ、回帰直線 から求めた hot flushを50%及び100%減少させる血 清E2濃度は、それぞれ61及び122pg/mLである(外 国人でのデータ)28)。


### (2) 骨代謝に対する作用

- 1) 卵巣摘出ラットにE2 10μg/kg/日を35日間皮下投与 したとき、破骨細胞面、骨芽細胞面及び骨形成率を正 常化し、海綿骨量の減少を抑制した29)。
- 2) 卵巣摘出ラット(6,12,30カ月齢)にE2 10μg/kg/48 時間を59日間皮下投与した実験で、卵巣摘出による 骨代謝回転の亢進を抑制することにより骨量減少を 抑制し、また、加齢により減少した骨量を増加させる ことが示された30)。

3) E2は、単核骨髄細胞、骨芽細胞並びに骨髄間質細胞 に作用して骨吸収性サイトカイン産生を抑制した。 その結果として破骨細胞の分化形成及び活性を抑 制し、アポトーシスを促進することが示唆された。 さらに破骨細胞に直接作用して骨吸収活性を抑制 すると考えられた。これらの作用を通して骨吸収を 抑制することにより、E2はエストロゲン欠乏により 亢進した骨代謝回転を調節し、骨密度を改善すると 推察される31~36)。

# 【有効成分に関する理化学的知見】

構造式:



般名:エストラジオール(Estradiol)

化 学 名: Estra-1,3,5(10)-triene-3,17β-diol

分子式: C18H24O2 分子量:272.38

> 状:白色~微黄色の結晶又は結晶性の粉末でにおいはない。 1.4-ジオキサン又はN.N-ジメチルホルムアミドに溶けやすく、 アセトンにやや溶けやすく、エタノール(95)にやや溶けに くく、ジエチルエーテルに溶けにくく、水にほとんど溶けない。 硫酸に溶ける。吸湿性である。

点:175~180℃ 分配係数:12(鉱油/水、30℃)

\*\*\*【取扱い上の注意】

(1)患者には包装のまま本剤を渡し、使用するときに包装から取り 出すように指示すること。

(2)0.09mg製剤及び0.18mg製剤を使用する場合、未使用分は 本剤が入っていた袋に戻し、開口部を折り曲げて保管し、開 封後12日以内に貼付するように指示すること。

# \*\*【包装】

エストラーナテープ0.09mg: 35枚[(7枚/1袋)×5袋] エストラーナテープ0.18mg: 35枚[(7枚/1袋)×5袋] エストラーナテープ0.36mg: 70枚[(1枚/1袋)×70袋] エストラーナテープ0.72mg: 70枚[(1枚/1袋)×70袋] 140枚[(1枚/1袋)×140袋]

### 【主要文献】

- 1) Holmberg, L. et al.: Lancet 363 (9407), 453, 2004
- Grady, D. et al.: Obstet. Gynecol. 85(2), 304, 1995
- Chlebowski, R.T. et al.: JAMA 289 (24), 3243, 2003
- Stefanick, M.L. et al.: JAMA 295(14), 1647, 2006 4)
- Beral, V. et al.: Lancet 362 (9382), 419, 2003
- Manson, J.E. et al.: N. Engl. J. Med. 349(6), 523, 2003
- Anderson, G.L. et al.: JAMA 291 (14), 1701, 2004
- Wassertheil-Smoller, S. et al.: JAMA 289 (20), 2673, 2003
- Hendrix S.L. et al.: Circulation 113(20), 2425, 2006
- Shumaker, S.A. et al.: JAMA 289(20), 2651, 2003
- Rapp, S.R. et al.: JAMA 289(20), 2663, 2003
- Shumaker, S.A.: JAMA 291 (24), 2947, 2004
- Espeland, M. A. et al.: JAMA 291 (24), 2959, 2004
- Rodriguez, C. et al.: JAMA 285(11), 1460, 2001
- Lacey, J.V.Jr. et al.: JAMA 288(3), 334, 2002 Beral, V. et al.: Lancet 369 (9574), 1703, 2007
- Anderson, G.L. et al.: JAMA 290(13), 1739, 2003
- Cirillo D.J., et al.: JAMA 293(3), 330, 2005
- Beral, V. et al.: Lancet 350(9084), 1047, 1997
- 20) 中道 : 臨床医薬 12(16), 3477, 1996
- 21) 中道 : 臨床医薬 12(16), 3497, 1996
- 22) 友田 豊ほか: 臨床医薬 12(16), 3535, 1996
- 23) 武谷 雄二ほか: 臨床医薬 12(18), 4047, 1996
- 雄二ほか: 臨床医薬 12(18), 4097, 1996 武谷 伊吹 25) 令人ほか: 臨床医薬 12(18), 4081, 1996

24)

- 26) 久光製薬社内資料(閉経後骨粗鬆症の臨床試験のまとめ)
- 27) 久光製薬社内資料 (卵巣摘出ラットの尾部皮膚温上昇に 対する17β-estradiolの作用)
- Steingold, K.A. et al.: J. Clin. Endocrinol. Metab. 61 (4), 627, 1985
- 29) Wronski, T. J. et al.: Endocrinology 123(2), 681, 1988
- 30) Gaumet, N. et al.: Gerontology 44(3), 132, 1998
- 31) Kimble, R.B. et al.: Endocrinology 136(7), 3054, 1995
- 32) Kimble, R.B. et al.: J. Biol. Chem. 271 (46), 28890, 1996
- 33) Jilka, R.L. et al.: Science 257 (5066), 88, 1992
- 34) Girasole, G. et al.: J. Clin. Invest. 89(3), 883, 1992
- 35) Hughes, D.E. et al.: Nat. Med. 2(10), 1132, 1996
- Mano, H. et al.: Biochem. Biophys. Res. Commun. 223(3), 637, 1996

# 【文献請求先】

主要文献に記載の社内資料につきましても下記にご請求ください。 久光製薬株式会社 学術部 お客様相談室

〒100-6330 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号

フリーダイヤル 0120-381332 FAX.(03)5293-1723

受付時間/9:00-17:50(土日・祝日・会社休日を除く)

製造販売元